


予防接種のお知らせ



予防接種を受ける時期

予防接種の受け方が次のようになりました。お子さんのいる家庭ではもう一度確認をお願いします。くわしくは、保健センターに確認をしてください。

予防接種の種類	法律等で定められている時期・回数	望ましい時期
BCG	生後6ヶ月未満(1回)	生後3ヶ月～生後6ヶ月未満
ポリオ	生後3ヶ月～90ヶ月未満 6週間以上の間隔を置いて2回	生後3ヶ月～18ヶ月
ジフテリア 百日せき 破傷風 【三種混合】	1期追加…生後3ヶ月～90ヶ月未満(1) 1期初回終了後、6ヶ月以上の間隔を置いて1回 2期…11歳、12歳 DT(沈降ジフテリア・破傷風混合トキソイド) ワクチンを1回	初回接種終了後 12ヶ月～18ヶ月未満 11歳・12歳(小学校6年生)
麻しん(はしか) 風しん 【混合】	初回…1歳～2歳未満 追加…小学校に入学する1年前の4月1日から3月31日まで(幼稚園の年長児) 平成20年4月1日から5年間以下の接種が追加されます。 (3期) 中学校1年生(13歳になる方) (3) (4期) 高校3年生(18歳になる方) (3)	(1期) 生後12ヶ月～24ヶ月に至るまでに1回 (2) (2期) 5歳以上7歳未満で1回 (小学校に入学する1年前の4月1日から3月31日まで(幼稚園の年長児)) 平成20年4月1日から5年間以下の接種が追加されます。 (3期) 中学校1年生(13歳になる方) (3) (4期) 高校3年生(18歳になる方) (3)
日本脳炎 (休止中、再開は未定)	1期初回…生後6ヶ月～90ヶ月未満 (1～4週間隔で2回) 1期追加…生後6ヶ月～90ヶ月未満 1期初回終了後、おおむね1年後に1回 2期…9歳～13歳(1回) 3期…廃止	3歳(1～4週間隔で2回) 4歳 1期初回終了後、おおむね1年後に1回 9歳・10歳(小学校4年生) 廃止

1 通常、DPT(ジフテリア・百日せき・破傷風混合トキソイド) ワクチンを接種します。

接種を受ける間隔は、1回目を受けたあとの2回目と3回目を3～8週で受けてください。

間があいてしまった場合は、自己負担になります。ただし、1回目と2回目の間があいてしまい自己負担になっても2回目と3回目(3～8週の間)に接種すれば無料で接種できます。

*1期の二種混合(ジフテリア・破傷風トキソイド)は、定期外接種です。

2 麻しん(はしか)・風しん混合予防接種は、1歳になつたらできるだけ早めに受けるようにしましょう

3 麻しん(はしか)・風しん混合予防接種は、中学校1年生及び高校3年生になる年の4月1日から翌年3月31日までの間に接種します。

中学校1年生は、中学校で集団接種となります。高校3年生は、個別接種となり委託医療機関にて無料で接種できます。

詳細は広報4月号でお知らせします。

お問い合わせ
保健センター

☎(84)1910

