

予防接種のお知らせ

予防接種を受ける時期

予防接種の受け方が次のようになりました。お子さんのいる家庭ではもう一度確認をお願いします。詳しくは、保健センターに確認をしてください。

予防接種の種類	法律等で定められている時期・回数	望ましい時期
BCG	生後6ヶ月未満（1回）	生後3ヶ月～6ヶ月未満 注：4月1日より集団接種から個別接種に変わります
ポリオ	生後3ヶ月～90ヶ月未満 41日以上の間隔をおいて2回 1期初回…生後3ヶ月～90ヶ月未満 20日～56日間隔で3回（※1） ◎20日～56日以上間があった場合は、自己負担になります	生後3ヶ月～18ヶ月 集団接種（保健センターにて実施） 1期初回…生後3ヶ月～12ヶ月 20日～56日間隔で3回（※1） ◎20日～56日以上間があった場合は、自己負担になります
ジフテリア 百日せき 破傷風 【三種混合】	1期追加…生後3ヶ月～90ヶ月未満 1期初回終了後、6ヶ月以上の間隔をおいて1回 2期…11歳・12歳 DT（沈降ジフテリア・破傷風混合トキソイド） ワクチンを1回	1期追加 初回接種終了後 12ヶ月～18ヶ月未満 2期…11歳・12歳（小学6年生）
麻しん（はしか） 風しん 【混合】	（1期）1歳～2歳未満 （2期）小学校に就学する1年前の4月1日から3月31日まで 平成20年4月1日から5年間以下の接種が追加されました。 （3期）中学1年生（13歳になる方）（※3） （4期）高校3年生（18歳になる方）（※3）	（1期）1歳～2歳未満までに1回（※2） （2期）5歳以上7歳未満で1回 （小学校に入学する年の1年前の4月1日から3月31日まで）俗に言う幼稚園の年長児 平成20年4月1日から5年間以下の接種が追加されました。 （3期）中学1年生（13歳になる方）（※3） （4期）高校3年生（18歳になる方）（※3）
日本脳炎 （休止中、再開は未定） 希望者には、保護者の同意書記入にて指定医療機関で接種できます。	1期初回…生後6ヶ月～90ヶ月未満 （6日～28日間隔で2回） 1期追加…生後6ヶ月～90ヶ月未満 1期初回終了後、おおむね1年後に1回 2期…9歳～13歳（1回）	1期初回…3歳（6日～28日間隔で2回） 1期追加…4歳 1期初回終了後、おおむね1年後に1回 2期…9歳・10歳（小学4年生）

※1

通常、DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風混合トキソイド）ワクチンを接種します。

接種を受ける間隔は、1回目を受けたあとの2回目と3回目を20日～56日間隔で受けてください。

間があいてしまった場合は、自己負担になります。ただし、1回目と2回目の間があいてしまえば自己負担になっても、2回目と3回目が20日～56日の間に接種すれば3回目は無料で接種できます。

※2

麻しん（はしか）・風しん混合予防接種は、1歳になったらできるだけ早めに受けるようにしましょう。

※3

麻しん（はしか）・風しん混合予防接種は、中学1年生及び高校3年生になる年の4月1日から翌年3月31日までの間に接種します。中学1年生は、各学校で集団接種となります。高校3年生（18歳になる方）は、個別接種となり委託医療機関にて無料で接種できます。

注：BCGは、4月1日より集団接種（保健センター）から個別接種（指定医療機関）に変更となります。接種できる期間が、生後3～6ヶ月未満と短いので忘れずに受けましょう。

○お問い合わせ

保健センター ☎(84)19110