



予防接種を受ける時期

予防接種の受け方が次のようになりました。
 お子さんのいる家庭ではもう一度確認をお願いします。
 かわしくは、保健センターに確認をしてください。

予防接種の種類	法律等で定められている時期・回数	望ましい時期
BCG	生後6ヶ月未満(1回) 生後3ヶ月～90ヶ月未満 6週間以上の間隔をおいて2回	生後6ヶ月未満
ポリオ	1期初回…生後3ヶ月～90ヶ月未満 3～8週間隔で3回 3～8週間以上間があいた場合は、公費ではなく自己負担になります	生後3ヶ月～18ヶ月 3～8週間隔で3回 3～8週間以上間があいた場合は、公費ではなく自己負担になります
ジフテリア 百日せき 破傷風 (三種混合)	1期追加…生後3ヶ月～90ヶ月未満 1期初回終了後、6ヶ月以上の間隔をおいて1回 2期…11歳、12歳 DT(沈降ジフテリア・破傷風混合トキソイド) ワクチンを1回	初回接種終了後 12ヶ月～18ヶ月未満 11歳・12歳(小学6年生)
麻疹(はしか)・風しん混合	初回…1歳～2歳未満 追加…小学校に就学する1年前の4月1日から 3月31日まで(幼稚園の年長児)	(1期) 生後12ヶ月～24ヶ月に至るまでに1回 (2期) 5歳以上7歳未満で1回(小学校に入學する年の1年前の4月1日～3月31日まで) (俗に言う幼稚園の年長児)
日本脳炎 (休止中、再開は未定)	1期初回…生後6ヶ月～90ヶ月未満 (1～4週間隔で2回) 1期追加…生後6ヶ月～90ヶ月未満 1期初回終了後、おおむね1年後に1回 2期…9歳～13歳(1回) 3期…廃止	3歳(1～4週間隔で2回) 4歳 1期初回終了後、おおむね1年後に1回 9歳・10歳(小学4年生)
		廃止

お問い合わせ
 保健センター
 ☎(84)1910



麻疹(はしか)・風しん
 混合予防接種は、1歳になっ
 たらできるだけ早めに受ける
 ようにしましょう

通常、DPT(ジフテリア・百日せき・破傷風混合トキソイド)ワクチンを接種します。接種を受ける間隔は、1回目を受けたあとの2回目と3回目を3～8週で受けてください。
 間があいてしまった場合は、自己負担になります。ただし、1回目と2回目の間があいてしまい自己負担になっても2回目と3回目が3～8週の間接種すれば公費で接種できます。

1期の二種混合(ジフテリア・破傷風トキソイド)は、定期外接種です。